

FOR ANIMAL USE ONLY

TYLECO F.G. 100

Reg. No. G2152 Act 36/1947
Zambia: 335/710V

STORAGE

Store in a cool (5 – 15 °C) dry place.
Close bag after use.

CONTAINS

Each kilogram of premix contains 10 % m/m Tylosin phosphate.

INDICATIONS

An aid in improving growth rate and/or feed conversion in pigs, feedlot cattle, broilers and replacement pullets.

WARNINGS

Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.
Withdraw Tyleco FGI00 medicated feed from pigs 15 days before slaughter, and in broilers 3 days before slaughter.

PRECAUTIONS AND SIDE EFFECTS

Oedema of the anal mucose, partial anal protrusion, arythema and pruritus have occasionally been reported following tylosin medication in pigs.

Operators should wear protective clothing and masks when handling the product. Wash hands thoroughly after use.

Do not use after expiry date indicated on the bag.

Medicated feed must be used within 3 months after mixing.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED.

Thoroughly mix the required amount of TYLECO F.G. 100 according to the instructions below:

Pigs:

Pig mass: {Feed category}	Gram TYLECO F.G. 100 premix per metric ton feed:	Gram TYLOSIN per metric ton feed:
11 kg -18 kg {Creep}	400	200
19 kg - 45 kg {Grower}	200 - 400	20 - 40
46 kg - market {Finisher}	200	20

SLEGS VIR DIEREGERBUIK

TYLECO F.G. 100

Reg. No. G2152 Wet 35/1947
Zambia: 335/710V

BERGING

Bewaar in 'n koel (5 – 15 °C) droë plek.
Maak sak toe na gebruik.

BEVAT

Elke kilogram voormengsel bevat 10 % m/m Tilosien fosfaat.

INDIKASIES

'n Hulpmiddel vir die verbetering van groeitempo en/ of voeromsette by varke, voerkraalbeeste, braaikuikens en vervanginshenne.

WAARSKUWINGS

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
Alhoewel hierdie middle breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.
Onttrek TYLECO FG 100 gemedikeerde voer 15 dae voor slagting by varke en 3 dae voor slagting by braaikuikens.

VOOSORGMAATREELS EN NEWE EFFEKTE:

Edeem van die anale slymvliese, gedeeltelike anale uitsluiting eriteem en jeuk word somtyds aangemeld na tilosien behandeling in varke.

Hanteerders moet beskermende klere en stofmaskers dra wanneer hulle die produk hanteer. Was hande deeglik na hantering van die produk.

Moet nie na aangeduide vervaldatum gebruik word nie.

Gemedikeerde voer moet binne 3 maande vanaf vermenging gebruik word.

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI. Die benodigde hoeveelheid TYLECO F.G. 100 voormengsel moet deeglik volgens die onderstaande aanwysings vermeng word:

Varke:

Gewig van vark: {Voer kategorie} ton voer	Gram TYLECO F.G. 100 voormengsel per metrieke ton voer:	Gram Tilosien per metrieke ton voer:
11 kg - 18 kg {Kruipvoer}	400	200
19 kg – 45 kg {Groeierende vark}	200 - 400	20 - 40
46 kg - mark {Slagvark}	200	20

It is recommended that TYLECO F.G. 100 is thoroughly mixed with a small quantity of finished feed (20 - 30 kg), before it is incorporated into the bulk of the feed being prepared. This procedure will assist in homogeneous distribution of TYLECO F.G. 100 in the final feed.

REPLACEMENT PULLETS:

In *Mycoplasma gallisepticum* sp positive flocks -for improved feed efficiency. Add 500 g TYLECO F.G. 100 per metric ton of complete feed to provide 50 ppm Tylosin.

In *Mycoplasma gallisepticum* negative flocks -for improved feed efficiency. Add 220 g TYLECO F.G. 100 per metric ton of complete feed to provide 22 ppm Tylosin.

BROILERS:

To improve the rate of mass gain and efficiency. Add 50 g TYLECO F.G. 100 per metric ton of complete feed to provide 5 ppm Tylosin.

FEEDLOT CATTLE:

Add 100 g to 1 000 kg complete cattle feed to give 10 ppm Tylosin. Mix to provide 100 mg Tylosin per head per day.

There is no withdrawal period for TYLECO F.G. 100 in cattle.

PRESENTATION

25 kg

REGISTRATION HOLDER

ECO Animal Health Southern Africa (Pty) Ltd
Co. Reg. No. 1992/00835/07
P O Box 2009, FAERIE GLEN 0043, R.S.A.
Tel: 012 991 6416

MARKETED BY

Afrivet Business Management (Pty) Ltd Co. Reg. Nr.
2000/011263/07
PO Box 2009 Faerie Glen 0043 Tel:+ 27 (0) 12 817 9060
Web: www.afrivet.co.za
Helpline: 0860 833 2787

Daar word aanbeveel dat TYLECO F.G. 100 deeglik met 'n klein hoeveelheid van die finale voer (20 - 30 kg), gemeng moet word alvorens dit in die totale voer wat voorberei word, gemeng word. Hierdie proses sal help met die egalige verspreiding van TYLECO F.G. 100 in die finale voermengsel.

VERVANGINGSHENNE:

In *Mycoplasma gallisepticum* positiewe groepe - vir verbeterde voerdoeltreffendheid, meng 500 g TYLECO F.G. 100 per metrieke ton volledige rantsoen om 50 dpm Tilosien te voorsien.

In *Mycoplasma gallisepticum* negatiewe groepe - vir verbeterde voer doeltreffendheid, meng 220 g TYLECO F.G. 100 per metrieke ton volledige rantsoen om 22 dpm Tilosien te voorsien.

BRAAIKUIKENS:

Om die tempo van gewigstoename en doeltreffendheid te verhoog, meng 50 g TYLECO F.G. 100 per metrieke ton volledige rantsoen om 5 dpm Tilosien te voorsien.

VOERKRAALBEESTE:

Meng 100 g met 1 000 kg volledige beesvoer om 10 dpm Tilosien te verskaf. Meng om 100 mg Tilosien per kop per dag te voorsien.

Daar is geen ontrekkingsperiode vir TYLECO F.G. 100 in beeste nie.

AANBIEDING

25 kg

REGISTRASIEHOUER

ECO Animal Health Southern Africa (Pty) Ltd
Mpy. Reg. No. 1992/00835/07
Posbus 2009, FAERIE GLEN 0043, R.S.A.
Tel: 012 991 6416

BEMARK DEUR

Afrivet Business Management (Pty) Ltd Mpy. Reg. Nr.
2000/011263/07
Posbus 2009 Faerie Glen 0043 Tel:+ 27 (0) 12 817 9060 Web:
www.afrivet.co.za
Hulplyn: 0860 833 2787